

小児常用薬剤用量チェック表

その他の薬剤

★年齢ごとの体重を上段の設定値とした場合の、各薬剤の添付文書における用量の上限(単位:DS, 細粒剤はg,シロップ剤はmL,坐剤,テープはmg)を示しました.最新の添付文書を確認してください.

平成16年6月30日現在

★1日投与量と1回投与量の記載あり,注意!

医薬品名	規格	1日投与量	最大用量	回数	年齢 体重(kg)	製剤量(1日量)															
						1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	18M 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38
アスピリン散10%	100 mg/g			3回		0.05-0.2			0.1-0.25			0.15-0.4			設定なし(成人は0.6-1.2)						
アスピリンSyr0.5%	5 mg/mL			3回		1-4			2-5			3-8			設定なし(成人は12-24)						
アスピリンDS2%	20 mg/g			3回		0.25-1			0.5-1.25			0.75-2			設定なし(成人は0.3-6)						
オノンDS10%	100 mg/g	7 mg/kg	10 mg/kg/day 450 mg/day	2回		0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.7
ザジテンSyr	0.2 mg/mL	0.06 mg/kg		2回		適宜		2.4	3	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4
ザジテンDS	1 mg/g	0.06 mg/kg		2回		適宜		0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3
テルギンG DS	1 mg/g			2回		適宜			0.4			0.5			0.7			1.0			1.3
ナウゼリンDS	10 mg/g	1-2 mg/kg	6才未満30 mg/day 6才以上1 mg/kg/day	3回		0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.0	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.0	3.0
ベラチンDS	1 mg/g	0.04 mg/kg		2回		★6歳以上は1日投与量を1.0mg/kgで計算															
ホクナリンテープ				1回		0.5 mg						1 mg						2 mg			
ムコサルDS	15 mg/g	0.9 mg/kg		3回		0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3
小児用ムコサルバンDS1.5%	15 mg/g	0.9 mg/kg		3回		0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3
ライトゲンSyr T				3回		1						2.0			3.3			6.6			
レスプレン細粒10%	100 mg/g			3回		0.05-0.1			0.1-0.2			0.2-0.3			0.3-0.45			設定なし(成人は0.6-0.9)			
ロベミン小児用細粒0.05%	0.5 mg/g	0.02-0.04 mg/kg		2-3回		禁忌		0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0

医薬品名	規格	1回投与量	最大用量	回数	製剤量(1回量)																
					0.10	0.15	0.20	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40	0.43	0.48	0.53	0.60	0.65	0.73	0.80	0.95	
セルテクトDS	20 mg/g	0.5 mg/kg/回	0.75mg/kg/回	2回				0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5
テオドールDS20%	200 mg/g	8 mg/kg/回		2回	★6カ月未満の乳児はテオフィリンクリアランスが一定していない																
ナウゼリン坐剤				2-3回	10 mg						30 mg										
ニボラジン小児用細粒0.6%	6 mg/g	①0.06 mg/kg/回		2回	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.38	
		②0.12 mg/kg/回		2回	0.08	0.12	0.15	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	
					② ★気管支喘息の場合																
ペリアクチンSyr	0.4 mg/mL			1-3回	2.0			3.0			4.0			5.0			6.5				
					★添付文書のAusberger式による1回投与量例を記入(1歳未満は,Ausberger式で計算)																
ペリアクチン散1%	10 mg/g			1-3回	0.08	0.09	0.1			0.2			0.2			0.3					
					★ペリアクチンシロップの小児用量をもとに換算(1歳未満は,Ausberger式で計算)																
ムコダインSyr 5%	50 mg/mL	10 mg/kg/回		3回	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6	
ムコダイン細粒	500 mg/g	10 mg/kg/回		3回	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	
					★ムコダインシロップの小児用量をもとに換算																
ムコダインDS	333 mg/g	10 mg/kg/回		3回	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14	
メブチンSyr5μg/mL	5 μg/mL	1.25 μg/kg/回 (6歳未満の乳幼児)		2-3回	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	5.0を1-2回							
					★6歳以上は1回25μg(シロップとして5mL)																
メブチン顆粒0.01%	100 μg/g	1.25 μg/kg/回 (6歳未満の乳幼児)		2-3回	0.05	0.08	0.10	0.13	0.14	0.15	0.18	0.2	0.22	0.25を1-2回							
					★6歳以上は1回25μg(顆粒として0.25g)																
幼児用PL顆粒				4回	設定なし						1.0			2.0			3.0				